SÝKORA MODŘINKA

Cyanistes caeruleus / Blue Tit

11 g

všežravec

Mé jméno napovídá hlavní poznávací znak – blankytně modré temeno. Obdobně jako pirát mám černý pásek přes oko.

Můžeš mě vidět, jak visím hlavou dolů při častých návštěvách krmítek. Nejím pouze semena a plody, jsem také cenný požírač hmyzu včetně škůdců.

K bydlení využívám dutiny stromů nebo budky.

běžný druh

Spolek Ametyst

POZOR NA ZÁMĚNU!

Sýkora modřinka je přeborník v bohaté snůšce, kdy dokáže mít 9–13 vajíček.

SÝKORA KOŇADRA

Parus major / Great Tit

11–22 g

všežravec

Jsem malý pěvec, přitom jsem největší a nejrozšířenější sýkora v Evropě.

Stavím hnízda v dutinách stromů či budkách. Využívám k tomu mech, trávu, kořínky, rostlinné chmýří, srst nebo peří.

Jsem jeden z nejčastějších návštěvníků krmítek. Olejnatá semínka si ráda beru po jednom a pochutnám si na nich v klidu opodál.

běžný druh

Spolek Ametyst

POZOR NA ZÁMĚNU!

V Anglii se koňadra naučila rozklovávat hliníková víčka lahví s mlékem, aby mohla sezobávat smetanu.

BRHLÍK LESNÍ

Sitta europaea / Nuthatch

19–29 g

všežravec

Velikostí se podobám vrabci. Díky mé barevnosti si mě s ním ale určitě nespletete.

Zdobí mě černá páska přes oko. Mám šedomodrá "hlavozáda" a světle oranžové bříško.

Celoročně žiju v páru. Hnízdím v dutinách a mám rád, když je u mě doma klid a nikdo mi tam neleze. Své teritorium si hlasitě střežím. Moje superschopnost? Umím lézt hlavou dolů!

běžný druh

Spolek Ametyst

POZNÁVACÍ ZNAKY

Když je vletový otvor do dutiny stromu nebo budky brhlíka moc velký, dovede si ho zmenšit pomocí hlíny.

BABOČKA PAVÍ OKO

Aglais io / Peacock Butterfly

60–64 mm

býložravec

Baboček je nás hodně druhů, ale mě si jen tak s jinou nespleteš. Mé výrazně zbarvené skvrny připomínající paví oka ti doslova padnou do oka.

Dospělce mého druhu najdeš nejčastěji na květech, zralém ovoci a vytékající míze.

Housenky si libují na kopřivách, případně na chmelu. Jako dospělí motýli zimujeme v dutinách stromů, sklepích, na půdách, v jeskyních a štolách.

běžný druh

Spolek Ametyst

POZNÁVACÍ ZNAKY

Křídla: výrazné skrvrny – paví oka, modravé skvrny v rozích křídel, vnější okraje křídel jsou mírně zubaté.

Housenka: černá, hustě posetá bílými skvrnami s černými trny.

Proč se motýli tak krásně lesknou a hýří barvami? Lesklé zbarvení je způsobeno lomem světla na šupinkách křídel, které umožňují společně s pigmenty vznik těchto nádherných barev.

BABOČKA KOPŘIVOVÁ

Aglais urticae / Small Tortoiseshell

45–50 mm

býložravec

Kopřivu zbožňuji. Dala mi své jméno. Rád se na ní totiž pasu jako housenka. Najdeš mě skoro všude, jsem vytrvalý a dobrý letec.

Jsem krásně zbarvený motýl, ale na barevnou přehlídku si musíš počkat, dokud neotevřu svá křídla. Zavřená křídla mi slouží jako kamufláž.

běžný druh

Spolek Ametyst

POZNÁVACÍ ZNAKY

Křídla: oranžovočervená barva s černými skvrnami (na horním okraji předních křídel vždy 3 černé skvrny na každém z křídel), dolní okraje lemuje řada modrých skvrn ve tvaru měsíčků na černém pozadí.

Housenka: černo-hnědá se žlutým podélným pruhem, pokrytá kratšími šedočernými trny – ochrana před predátory.

Během páření sameček babočky vystoupí na její zadní křídla, do kterých následně rázně bubnuje svými tykadly. Toto bubnování je tak výrazné, že jej může slyšet i člověk.

RUMĚNICE POSPOLNÁ

Pyrrhocoris apterus / Red Firebug

10–12 mm

všežravec

Co je to malé červené na patách stromů či zdech? Ve většině případů jsem to já, nápadná a hojná ploštice.
Na takových místech se rády sluníme ve velkých skupinách dospělců i larev (nymf) pohromadě. Sajeme šťávy z rostlin a jejich plodů, ale i z mrtvých bezobratlých živočichů či jejich vajíček.
Mám ráda vlhčí a slunná místa a ukrývám se v různých škvírách nebo pod listím.
V ohrožení dokážu vypustit typicky zapáchající sekret k odstrašení narušitele.

běžný druh

Spolek Ametyst

POZNÁVACÍ ZNAKY

Výrazné zbarvení a černé kulaté skvrny připomínající oči slouží k ochraně před predátory. Naší oblíbenou potravou jsou šťávy z plodů lípy.

KŘIŽÁK PRUHOVANÝ

Argiope bruennichi / Wasp Spider

až 20 mm

masožravec

Jako výrazně pruhovaná samička sedávám na síti v travnatém porostu. Moje sítě mají často hustý klikatý pás pavučiny. Do ní chytám hmyz, hlavně sarančata. Jako jiní pavouci své oběti po ulovení usmrtím jedem. Ale neboj, pro člověka je můj jed neškodný.

Jako sameček jsem menší a nenápadnější. Po společném páření mě samička sežere.

běžný druh

Spolek Ametyst

POZNÁVACÍ ZNAKY

Druh původně ze Středomoří, který se nedávno rozšířil do mírného pásu. U nás se šíří od 90. let 20. století, dnes je běžný na většině území. Našim křižákům příliš nekonkuruje a není považován za invazní druh. Na rozdíl od nich staví sítě nízko nad zemí a loví velké druhy hmyzu.

BOBR EVROPSKÝ

Castor fiber / European beaver

11–30 kg býložravec

Jsem 2. největší hlodavec světa. Mám hustou a nesmáčivou hnědočernou srst, uzavíratelné nozdry a zvukovody.

Silný ocas používám jako veslo i kormidlo. K pohybu ve vodě mi slouží plovací blány na zadních nohách. Hryžu masivními oranžovými řezáky. Jsem výborný stavitel a buduji soustavy hrází, hradů a nor.

Nejvíce si pochutnám na větvičkách, lýku, kůře a různých bylinách.

Božkovský ostrov

Spolek Ametyst

POZOR NA ZÁMĚNU!

Lidé si často mohou nutrii splést také s ondatrou. Ta je se svou váhou okolo 1,5 kg spíše trošku přerostlým potkanem.



SLEPÝŠ KŘEHKÝ

Anguis fragilis / Slow Worm

25–75 g

masožravec

Často si mě lidé pletou s hadem, ale nenechte se zmást, patřím mezi beznohé ještěry. Důkazem jsou má pohyblivá víčka, kterými na vás dokážu mrknout, to had nezvládne. Nejaktivnější jsem časně z rána a po dešti, kdy vyrážím hledat potravu. Nejraději mám bezobratlé pomalu lezoucí živočichy, zejména žížaly a plže. Domovem jsou pro mě listnaté a smíšené lesy a vlhčí travnatá území, zahrady nebo jiné travnaté plochy s trochou křovin. Zimu trávím ve stavu strnulosti v bezpečném úkrytu.

téměř na celém území, chráněný, silně ohrožený druh

Spolek Ametyst

POZNÁVACÍ ZNAKY

Malá, tupě zakončená hlava, po celé délce hřbetu dva pruhy větších šupin.
Barevnost: nejčastěji různé odstíny hnědé.
Délka těla: 30–45 cm.

Slepýš je schopen autotomie. Jeho ocas se v případě nebezpečí odlomí a poskytne čas k úniku před predátorem. Po nějaké době se ocas částečně regeneruje.

JEŠTĚRKA OBECNÁ

Lacerta agilis / Sand lizard

10–35 g

masožravec

Nás samečky poznáš snadno díky hnědému hřbetu a zeleným bokům. Ty máme výrazné v době rozmnožování. Oproti nám jsou samičky hnědé, nenápadné a poseté tečkami.
Žijeme v teplejším a sušším prostředí, často na loukách a jejich okrajích a v křovinatých mezích, ale i ve světlejších lesích, zahradách a na okrajích polí.
Potřebujeme dostatek nocovišť a úkrytů, v zemi, mezi kameny, pod hustým křovím.
Sluníme se na kamenech, zídkách, kládách.
Živíme se hmyzem a pavouky.

téměř na celém území, chráněný, silně ohrožený druh

Spolek Ametyst

POZNÁVACÍ ZNAKY

Tělo 20–25 cm, široká hlava s kulatým nosem, krátké končetiny s 5 prsty zakončené drápkem, dlouhý ocas slouží k lepší dynamice pohybu.



Samička klade kožovitá vajíčka na přelomu června a července na suchém a slunném místě do jamky, kterou sama vyhrabala, 4 až 5 cm velká mláďata se z nich líhnou po dvou měsících.



PÁSKOVKA KEŘOVÁ

Cepaea hortensis / White-lipped snail

19–21 mm

býložravec

Jmenuji se podle typické výrazné pásky na žlutavé ulitě. Žiju v početných skupinách ve vlhkých listnatých a smíšených lesích, ale i ve městech. Líbí se mi v křovinách.

Přestože jsem malý plž, dožívám se v průměru 5 let. Na rozdíl od jiných druhů býložravých měkkýšů neškodím rostlinám ani plodinám.

běžný druh

Spolek Ametyst

POZNÁVACÍ ZNAKY

Základní zbarvení ulity je světlé s 5 tenkými tmavými páskami tvořící spirálu. Noha je světlá až šedavá s dlouhými tykadly.

Páskovka keřová se může objevit v několika barevných variantách (kromě páskované může být ulita žlutá, hnědá nebo kropenatá). Dokonce se páří s jinými páskovkami, zejména hajní. Díky tomu lze v přírodě nalézt hybridy - jedince nesoucí hlavní znaky obou druhů.

HOLUB HŘIVNÁČ

Columba palumbus / Wood pigeon

300–690 g

býložravec

Ve střední Evropě se můžu pyšnit titulem největšího druhu holuba. Jsem nepřehlédnutelný v lesích, zahradách i parcích. Někteří z nás na zimu zůstávají, jiní odlétají do Středomoří.

Hnízda si stavím na stromech, bývají poměrně řídká a nepevná. Mám rád společnost, zejména během zimy se zdržuji ve větších hejnech. Svému partnerovi jsem věrný po celý život.

běžný druh

Spolek Ametyst

POZNÁVACÍ ZNAKY

Za letu má bílý pruh na křídlech. Opeření je převážně šedé s vínově červenou hrudí.

Druh, u kterého probíhá v posledních desetiletích silná synantropizace, stále častěji žije v blízkosti člověka, i v centrech velkých měst. Přízvisko "hřivnáč" vzniklo na základě středověké ozdoby krku "hřivna" používané slovanskými kmeny jako platidlo. Měla stejný tvar a velikost jako skvrna na krku tohoto druhu holuba.

LABUŤ VELKÁ

Cygnus olor / Mute swan

8,5–12 kg býložravec

Všichni jistě známe pohádku o ošklivém káčátku. Hlavním hrdinou jsem právě já! Jako mládě jsem šedavá a nevýrazná. Vyrostu v krásného velkého bílého ptáka s dlouhým krkem a oranžovým zobákem.

Patřím mezi největší a nejtěžší ptáky v ČR. Vzlétám proto těžkopádně. Při vzletu hlasitě bouchám křídly o vodní hladinu. Pochutnám si na vodních rostlinách, které hledám ve stojatých a pomalu tekoucích vodách.

Bolevecké rybníky, Božkovský ostrov, Zábělá

Spolek Ametyst

POZNÁVACÍ ZNAKY

Víš, že existuje i labuť černá? Jejím domovem jsou jezera, řeky s hustě zarostlými břehy a bažiny v Austrálii a na přilehlých ostrovech.

UŽOVKA OBOJKOVÁ

Natrix natrix / Grass snake

150–350 g

masožravec

Jsem sice had, ale rovnou si pojďme říct, že nejsem pro člověka jedovatá ani nebezpečná. Zimu přečkávám v zimním spánku a krátce z jara už si hledám partnera.

Jako samička kladu kožovitá vejce, která zahrabávám do tlejícího materiálu. Zbožňuji vodu. Lovím zejména obojživelníky a ryby. Nepohrdnu ani menšími hlodavci či ptáky.

Bolevecké rybníky, Lobezský park – zvláště chráněný, ohrožený druh

Spolek Ametyst

POZOR NA ZÁMĚNU!

Hlavní znaky užovky obojkové:
vlhkomilná, délka 80–130 cm, záhlaví zdobí žluté nebo bělavé „měsíčky“, kulatá zornička oka, nemá na hřbetě žádnou klikatou čáru.

Hlavní znaky užovky hladké:
suchomilná a sluní se, délka až 80 cm, bez “ měsíčků” na hlavě, kulatá zornička oka, na hřbetě má dvě řady přerušovaných skvrn, které se někdy slijí v klikaté pásy. Proto si ji lidé často pletou se zmijí obecnou.

Hlavní znaky zmije obecné:
na chladných a vlhčích místech, délka asi 50 cm (nikdy ne víc než metr), úzké štěrbinovité zornice, na hřbetě tmavá „klikatá" čára, vypadá "naštvaně".

V dobrých podmínkách se užovky dožívají 15 až 25 let. V nebezpečí se brání syčením, nafukováním těla, vypouštěním páchnoucího výměšku análních žláz a dokonce předstírají, že jsou mrtvé.



STRAKAPOUD VELKÝ

Dendrocopos major / Great spotted

70–90 g

všežravec

Mým původním domovem jsou lesy, ale žiji i v parcích a zahradách. Nejčastěji hnízdím v dutinách stromů, které si hloubím společně s partnerem v kmenech nebo větvích. Tvorba našich příbytků může trvat několik týdnů. Stejně jako ostatní šplhavci bubnuji do rezonujících větví a kmenů, abych označil své teritorium nebo nalákal samičky. Podobný zvuk vydávám, i když se snažím dostat pod kůru stromů k lahodnému hmyzu a jeho larvám. Ty pak vybírám pomocí lepkavého jazyka. Málokdo o mě ví, že jsem predátorem menších ptáků, dokážu jim vykrádat hnízda.

Bolevecké rybníky, Božkovský ostrov, Zábělá

Spolek Ametyst

POZNÁVACÍ ZNAKY

Černý pruh od zobáku je propojen s černým týlem.

Strakapoud velký je jeden z pěti druhů strakapoudů žijících v ČR. Kromě něj můžeme na Plzeňsku potkat i strakapouda malého a prostředního, strakapoud jižní a bělohřbetý se vyskytují více na východ a jih odtud.

DATEL ČERNÝ

(Drycopus martius / Black woodpecker

300–400 g

masožravec

Možná mě znáš pod přezdívkou "lékař" lesa nebo stromů. Jsem největší šplhavec žijící v ČR a najdeš mě hlavně v lesích. Dutiny pro svá hnízda si tesám sám, nejčastěji ve starých bucích. Když dutinu opustím, často ji obývají jiné druhy zvířat.

Jako další šplhavci používám k vyznačení teritoria a lákání samičky bubnování, které je pomalejší a delší než u strakapouda. Mojí oblíbenou potravou jsou mravenci. Ve dřevě se k nim dostanu díky velmi dlouhému jazyku s harpunovitými háčky na konci a lepivým slinám.

Bolevecké rybníky, Zábělá

Spolek Ametyst

POZOR NA ZÁMĚNU!

Datel: velikost přes 40 cm, jednolitě černý, červené temeno hlavy u samce, malá červená ploška v týle u samice, světlý zobák a světlé oko.



Strakapoud: velikost 22–23 cm, černobíle zbarvený s červenými spodními ocasními krovkami.

Datel černý je spolehlivý indikátor lesa s dostatkem starých stromů. Datel je deštníkový druh. Jeho ochrana a podpora pomáhá i dalším živočichům a rostlinám, kteří obývají stejné prostředí.

LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ

Alcedo atthis / Common Kingfisher

30–45 g **masožravec**

Jsem pestře zbarvený pták o málo větší než vrabec. Přezdívá se mi říční drahokam. Obývám místa v blízkosti pomalu tekoucích čistých řek, potoků a jezer s pobřežními stěnami, kde si vyhrabávám hnízdní nory. Živím se drobnými rybkami, vodním hmyzem nebo obojživelníky. Mám dobře vyvinutý zrak, na potravu číhám na větvi nebo ji vyhlížím za třepotavého letu. Při střemhlavém útoku za kořistí pod vodu využívám hmat. Úspěšnost mého lovu je hlavně v mládí velmi nízká, vyjde mi přibližně každý desátý pokus, u zkušených rodičovských párů je to každý druhý. Kromě doby rozmnožování žiji samotářsky a přísně si hlídám své území.

Božkovský ostrov, chráněný druh

Spolek Ametyst

POZNÁVACÍ ZNAKY

Velikost 16–17 cm, s oranžovou spodinou a modrým hřbetem, křídly a temenem, nápadně dlouhý zašpičatělý zobák.

Pokud zahlédnete ledňáčka nesoucího rybu, zkuste se zaměřit na to, jakým směrem má ryba hlavu. Pokud vidíte ze zobáku trčet ocas, znamená to, že je ryba pro daného ledňáčka. Pokud je hlava ryby směrem ven ze zobáku, bude následně věnována mláďatům.

VOLAVKA POPELAVÁ

Ardea cinerea / Grey heron

1–2 kg

masožravec

Jsem větší druh volavky s typicky dlouhýma nohama přizpůsobenýma k brodění. Ráda se zdržuji v blízkosti vod bohatých na ryby. Ráda lovím i hraboše na polích.

Ve větších rybničních oblastech hnízdíme pohromadě v koloniích. Každý pár má své samostatné hnízdo, zpravidla na vysokém stromě, často se do něj vracíme více let po sobě. Stavební materiál přináší většinou samec, samotné hnízdo vytváří samice.

Božkovský ostrov,
Lobezský park, Zábělá

Spolek Ametyst

POZOR NA ZÁMĚNU!

Volavku od čápa při letu snadno rozpoznáme. Čáp má krk natažený a volavka esovitě prohnutý.

Při lovu stojí volavka bez pohybu a upřeně hledí na vodní hladinu nebo na zem. Kořisti, která se přiblíží na vhodnou vzdálenost, se zmocňuje rychlým škubnutím krku a doslova ji harpunuje.

Na rozdíl od jiných druhů ptáků u nás volavek přibývá. Ptáci žijící u nás na podzim většinou odlétají do tepla. Na zimu k nám naopak přilétají volavky ze severu.



SKOKAN ZELENÝ

Pelophylax esculentus / Edible Frog

KG **6–30 g** **masožravec**

S hrdostí o sobě mohu říci, že jsem složitý hybrid dvou rodičovských druhů skokanů, krátkonohého a skřehotavého. Miluji vodu, vždy mě nalezneš v její blízkosti, narozdíl od ropuch nebo hnědých skokanů. Zabydlím se hlavně tam, kde je dostatek příbřežní (litorální) vegetace. Jsem vyhledávanou pochoutkou mnoha živočišných druhů, proto jsem si vytvořil hned několik obranných reakcí. Unikám do vody, kde se schovám do bahna nebo do rostlin. Případně vydávám únikové hlasy podobné dětskému pláči nebo se nafouknu.

Lobezský park, Božkovský ostrov

Spolek Ametyst

POZNÁVACÍ ZNAKY

Velikost až 12 cm. Obvykle v různých odstínech zelené, hřbet je pokryt většími hnědými nebo černými skvrnami. Středem hřbetu se téměř vždy táhne nápadný výrazně svítivý žlutozelený proužek. Břicho je často tmavě skvrnité, mohou se vyskytnout jedinci s čistě bílým břichem.



Naši zelení neboli vodní skokani vytvářejí na mnoha lokalitách smíšené populace alespoň dvou druhů. Je proto často velmi těžké určit přesný druh. V terénu je odlišení možné podle hlasových projevů nebo sledováním kombinace více znaků: velikost, barevnost, skvrnitost a tvar patního hrbolu. Nejpřesnějším prostředkem jsou genetické testy.

OKRUŽÁK PLOSKÝ

Planorbarius corneus / Ram´s horn snail

30 mm

všežravec

Poznáš mě podle typicky zploštělé a silnostěnné ulity. Nacházím se ve sladkých vodách, kde se živím řasami a zbytky rostlin nebo živočichů. Mám proto důležité místo v potravním řetězci. Přestože žiji ve vodě, mám plíce, a v krvi (hemolymfě) mám hemoglobin podobně jako ty. Ten mi pomáhá lépe vázat vzdušný kyslík a dokonaleji dýchat. Stejně jako ostatní vodní plži jsem mezihostitelem parazitů (zejména motolice) ryb, ptáků i savců. Při kontaktu se mnou buď opatrný a raději použij rukavice.

Lobezský park, Bolevecké rybníky

Spolek Ametyst

POZNÁVACÍ ZNAKY

Silná zploštělá lesklá ulita hnědé až hnědozelené barvy, tmavé tělo, dlouhá nitkovitá tykadla.

V němčině se okružákovi říká Posthornesnecke, v překladu šnek – poštovní roh a to proto, že jeho ulita připomíná právě tento poštovní symbol. Nemá víčko, ale za nepříznivých podmínek se dokáže zatáhnout hluboko do ulity a tak přečkat například zimu. Vyšlechtěni byli také albíni, kteří mají sytě červenou nohu zbarvenou díky přítomnosti hemoglobinu.

PLOVATKA BAHENNÍ

Lymnaea stagnalis / Great pond snail

20–30 mm

býložravec

Jsem velmi rozšířený druh vodního plže. Žiju v pomalu tekoucích i stojatých vodách. Mnohdy mě nalezneš na spodní straně hladiny, chodidlem vzhůru. A proč? Dýchám vzdušný kyslík a k tomu mám vyvinutý speciální dýchací otvor, který vystrkuji nad hladinu.

Jsem pěkný živočich, proto bývám chován v akváriích. Pozor na mě, okusuji ale rád vodní rostliny.

Lobezský park,
Bolevecké rybníky

Spolek Ametyst

POZOR NA ZÁMĚNU!

Plovatka bahenní: 20–30 mm široká, hnědá až černá ulita protažená do špičky. Tmavé tělo s výraznými tykadly. Ničí akvarijní rostliny. Málo dotčený druh.

Bahenka živorodá: až 35 mm, zelenohnědá ulita s třemi podélnými pruhy, s výrazně klenutými závity. Nepoškozuje akvarijní rostliny. Téměř ohrožený druh.

Může být mezihostitelem larev ptačích motolic. Ty mohou lidem způsobit alergickou reakci na kůži (cerkáriová dermatitida).
Na Boleveckých rybnících se proto výskyt těchto larev dlouhodobě sleduje.



VÁŽKA PLOSKÁ

Libellula depressa / Broad-bodied Chaser

70–80 mm

masožravec

První čeho si určitě všimneš, je můj nápadně široký zadeček. Samci mého druhu jej mají blankytně modrý, samičky naopak žlutohnědý. V oblibě mám málo zarostlé vody, proto často osidluji nově vzniklé malé vodní plochy, jsem takzvaný pionýrský druh. Daří se mi dobře i v mělčích prohřátých vodách rybníků, tůní, slepých ramen řek a nevadí mi ani zahradní jezírka.
Všechna moje vývojová stádia jsou dravá. Pochutnám si na drobném hmyzu. Jako dospělec obvykle lovím přímo v letu.

Lobezský park,
Božkovský ostrov,
Bolevecké rybníky

Spolek Ametyst

POZNÁVACÍ ZNAKY

Porovnání samičky a samečka.
Rozdíly: sameček – blankytně modrý zadeček, samička – žlutohnědý zadeček.

Shody: hnědá hruď, dva páry průhledných křídel s velkými tmavými skvrnami u těla.



Dospělce můžeme běžně vidět od května do srpna. Vážky kladou vajíčka do více vodních nádrží poblíž sebe, aby se zvýšila šance na přežití larev. Při vyschnutí vodní plochy jsou larvy schopné zahrabat se do vlhkého bahna na dně a přečkat tak nepříznivé období (přerušit svůj vývoj) až na několik týdnů. Z vajíčka se nejprve vylíhne prelarva, která je ukryta v blanitém obalu. Toto stadium je neobyčejně krátké, trvá 3–20 sekund.



MLOK SKVRNITÝ

Salamandra salamandra / Fire salamander

19 g

masožravec

Vypadám sice jako ještěrka, ale nenechte se zmást. Patřím mezi ocasaté obojživelníky obdobně jako čolek nebo axolotl. Vyhledávám vlhké listnaté a smíšené lesy s čistými potůčky a pomalu tekoucími říčkami. Schovávám se v úkrytech pod kořeny nebo kameny.

Nejsem zrovna rychlý běžec, proto při střetu s případnými predátory mohu použít svůj jed na bázi neurotoxinu. Jako drtivá většina obojživelníků v ČR jsem zákonem chráněn.

Zábělá

Spolek Ametyst

POZNÁVACÍ ZNAKY

Délka těla do 20 cm, černé zbarvení s výraznými žlutými fleky – každý jedinec má originální fleky.



Mlok je vejcoživorodý – larvy se líhnou v okamžiku kladení vajíček. Žije a rozmnožuje se na souši, pouze larvy se vyvíjejí ve vodě. Z úkrytů vylézá převážně večer a v noci, ale za deště a po něm je možné ho spatřit i ve dne.

KORMORÁN VELKÝ

Phalacrocorax carbo / Great cormorant

1,5–3 kg

masožravec

Jsem rybožravý pták. Buduji svá hnízda na stromech v blízkosti vody. Nerad hnízdím sám, nalezneš mě v koloniích i s jinými vodními ptáky.
Jak mě poznáš? Jsem celý černý s fialovomodrým leskem na tvářích a stehnech. V době páření mohu mít na hrdle a bocích bílé skvrny. V mládí jsem hnědočerný až hnědošedý se světlým břichem. Typický je pro mě dlouhý žlutošedý ostře zakončený zobák. Potkat mě můžeš kdekoliv na světě, mimo Jižní Ameriku a Antarktidu.

Zábělá

Spolek Ametyst

POZOR NA ZÁMĚNU!

Kormorán velký a husa velká – oba druhy se při letu často řadí do formace klínu. Rozeznat je od sebe lze podle mávání křídel, kormorán mává rychleji než husa. Dalším poznávacím znamením za letu je charakteristický obrys těla. Při letu má kormorán krk natažený dopředu. S jeho dlouhým ocasem a roztaženými křídly připomíná letící kříž.

Populace na území ČR poměrně malá. V podzimních měsících táhnou přes naše území tisíce jedinců, kteří mohou způsobit nemalé škody na rybnících. Kormoráni mimo hnízdní období nocují a loví hromadně. Stromy na nocovištích jsou snadno poznatelné podle "obílení" trusem, který je velmi agresivní a stromy často hynou.

CHROBÁK LESNÍ

Anoplotrupes stercorosus / Dor Beetle

12–19 mm

všežravec

Jsem zavalitý a poměrně nemotorný brouk, ale na kráse mi to neubírá. Jsem černý s namodralým kovovým leskem, výraznějším na spodní straně těla.

Nejčastěji se se mnou setkáš v lesích a na jejich okrajích, na mýtinách a lesních cestách. Zbožňuji trus, rozkládající se houby a rostlinné zbytky. V ČR jsem hojným druhem.

Zábělá,
Bolevecké rybníky

Spolek Ametyst

POZOR NA ZÁMĚNU!

Chrobák lesní se dá nejsnadněji zaměnit se stejně velkým chrobákem jarním, který má krovky bez rýh.

Tito brouci jsou všeobecně známí péčí o své potomstvo. Pod trusem hloubí dlouhé chodby, do kterých zatahují části exkrementů, tlejících hub, listí a dřeva. Na ně kladou vajíčka. Vylíhlé larvy se těmito zásobami živí.